



Breezhaler

Consejos importantes para evitar fallos cuando lo tome

Introduzca la cápsula dentro del inhalador inmediatamente antes de su uso. Asegúrese de haber oído el "clic" que indica que se ha pinchado la cápsula correctamente: es muy importante apretar bien los botones que perforan la cápsula y soltarlos completamente una vez haya oído el "clic".

No olvide vaciar el pecho de aire antes de tomar el inhalador, porque así conseguirá que llegue más medicamento a los pulmones. ¡Cuidado! No expulse el aire en el interior de la boquilla.

Cuando coloque la boquilla en su boca, no pare de respirar hasta llenar el pecho completamente. Ya sin el inhalador en la boca, recuerde que debe aguantar la respiración entre 5 y 10 segundos.

Si al vaciar la cápsula queda polvo dentro o tiene dudas de que haya realizado bien la toma, repítala otra vez. En este caso no es necesario apretar de nuevo los botones laterales.

No olvide enjuagarse la boca con agua para limpiar restos del medicamento que ha tomado.

Para terminar, recuerde que si desea limpiar la boquilla debe utilizar un pañuelo de papel o paño seco. No limpie la boquilla con agua ni paños húmedos, y guarde el inhalador cerrado y en lugar seco.

Breezhaler

Instrucciones para usarlo correctamente



1. Extraer una cápsula de su envoltorio de aluminio inmediatamente antes de su uso tal como se indica en las instrucciones.



2. Abrir la tapa tirando hacia arriba. Sujetar la parte inferior del inhalador con una mano y con la otra inclinar la boquilla.



3. Introducir la cápsula en el depósito.



4. Cerrar la boquilla hasta oír un "clic".



5. Perforar la cápsula: Apretar hasta el fondo los botones laterales y soltarlos completamente.



6. Expulsar el aire: Antes de colocar la boquilla en la boca es importante expulsar todo el aire que se pueda hasta vaciar el pecho. Nunca soplar dentro de la boquilla.



7. Tomar aire: Colocar la boquilla en la boca y cerrar bien los labios alrededor. Empezar a tomar aire desde el principio y tanto tiempo como pueda.



8. Aguantar la respiración: Al terminar de tomar aire, retirar el inhalador de la boca y aguantar sin respirar entre 5 y 10 segundos.



9. Retirar la cápsula, cerrar la boquilla y poner el capuchón.



10. Enjuagar la boca con agua para limpiar restos del medicamento que ha tomado. Sin tragársela, expulsarla después del enjuague.