



Respimat

Consejos importantes para evitar fallos cuando lo tome

La primera vez que destape la caja, el cartucho que contiene el medicamento estará fuera de la carcasa. Siga con atención las instrucciones de montaje o pida ayuda a su farmacéutico. Además, antes de usarlo por primera vez, purgue el inhalador pulsándolo 4 veces al aire.

No olvide vaciar el pecho de aire antes de tomar el inhalador, porque así conseguirá que llegue más medicamento a los pulmones. ¡Cuidado! No expulse el aire en el interior de la boquilla. No pulse el botón gris si acaba de tomar aire.

Cuando haya pulsado el botón gris, no pare de respirar y recuerde que debe aguantar la respiración entre 5 y 10 segundos.

No tape con los dedos las dos ranuras que están la parte lateral de la boquilla.

Para repetir la toma, debe cerrar el capuchón y volver a cargar el inhalador girando la parte inferior.

Cuando el inhalador está vacío aparece una flecha roja indicando el cero.

No olvide enjuagarse la boca con agua para limpiar restos del medicamento que ha tomado.

Para terminar, recuerde que si desea limpiar la boquilla debe utilizar un pañuelo de papel o paño seco. No limpie la boquilla con agua ni paños húmedos.

Respimat

Instrucciones para usarlo correctamente



1. Sujetar con fuerza el inhalador por la parte inferior con el capuchón hacia arriba y cerrado. Girar la parte transparente con fuerza media vuelta hacia la derecha hasta que haga "clic".



2. Abrir el capuchón.



3. Expulsar el aire: Antes de colocar la boquilla en la boca, es importante expulsar todo el aire que se pueda hasta vaciar el pecho. Nunca soplar dentro de la boquilla.



4. Tomar aire: Colocar la boquilla en la boca y cerrar bien los labios alrededor. El botón gris debe quedar arriba. Empezar a tomar aire lentamente, apretar el botón y continuar tomando aire tanto tiempo como se pueda.



5. Aguantar la respiración: Al terminar de tomar aire, retirar el inhalador de la boca y aguantar sin respirar entre 5 y 10 segundos.



6. Cerrar el capuchón. Si tiene que tomar otra dosis repetir desde el principio, o sea, con el capuchón cerrado girar la parte transparente media vuelta hacia la derecha hasta que haga "clic".



7. Enjuagar la boca con agua para limpiar restos del medicamento que ha tomado. Sin tragársela, expulsarla después del enjuague.