Nexthaler

Consejos importantes para evitar fallos cuando lo tome

No olvidar vaciar el pecho de aire antes de tomar el inhalador, porque asì conseguirá más fuerza para llevar el medicamento a los pulmones. No expulsar el aire en el interior de la boquilla.

No parar de respirar hasta llenar el pecho completamente. No bloquear las entradas de aire (rejilla al lado de la boquilla)

Si desea limpiar la boquilla utilizar un pañuelo de papel o paño seco. No limpiar la boquilla con agua ni paños húmedos y guardar el inhalador cerrado y en lugar seco.

El indicador de dosis (ventana pequeña lateral) con el uso del inhalador va descendiendo con cada toma (empieza en 120, 119, 118,... 0).

Puede notar un sabor dulce debido al excipiente (lactosa).

© 2014 Edikamed SL ISBN: 978-84-7877-823-2

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS
AstraZeneca
faecap Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria
gr ap Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria. GRAP

Nexthaler

Instrucciones para usarlo correctamente

1. **Abrir la tapa hasta oír clic.**

2. **Echar aire:** Antes de colocar la boquilla en la boca, expulsar todo el aire que pueda hasta vaciar el pecho. No soplar dentro de la boquilla.

3. **Tomar aire:** Colocar la boquilla en la boca y cerrar bien los labios alrededor. Entonces tomar aire muy fuerte desde el principio, profundamente y tanto tiempo como pueda. Mientras toma aire, oirá un clic, no parar y seguir tomando aire por la boquilla hasta que pueda.

4. **Aguantar la respiración:** Al terminar de tomar aire, retirar el inhalador de la boca y aguantar sin respirar unos segundos (contar al menos unos cinco segundos).

5. **Cerrar la tapa.**

6. **Enjuagar la boca:** Para limpiar restos del medicamento que ha tomado, enjuagar la boca con agua y sin tragar, expulsarla.

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS